

Barszcz Sosnowskiego (*Heracleum sosnowskyi Manden.*) to dwuletnia roślina, która pochodzi z rejonu Kaukazu. Roślina została sprowadzona do Polski z ZSRR w latach 60 XX wieku jako tania roślina pastewna. Niedługo po wprowadzeniu do uprawy została uznana za groźny gatunek inwazyjny. Na terenie Gminy Wiśniowa występuje przede wszystkim w korycie Krzyworzeki. Według szacunków jest to obszar około 0,6 ha.

W środowisku naturalnym barszcz Sosnowskiego mierzy około 1,5 metra. Nasiona mogą wykiełkować nawet po czterech latach. Pierwszy rok wzrostu to pojawienie się rozety, dopiero w czasie drugiego roku powstają pędy nasienne, które owocują dając nasiona. Z czasem po etapie owocowania roślina zamiera. Wszystkie liście barszczu Sosnowskiego od strony wewnętrznej są lekko owłosione, podobnie jak i łodyga. Na uwagę zasługuje korzeń rośliny, który może wrastać nawet na dwa metry w jej głąb. Jego trzon sięga do 30 cm pod ziemię tworząc jego zasadniczą masę wraz z licznymi odgałęzieniami wokół palowego korzenia głównego

W wyniku bezpośredniego kontaktu z roślinami barszczu Sosnowskiego na skórze pojawiają się objawy poparzenia takie jak zaczerwienienie, obrzęki i pęcherze. Kontakt z rośliną może powodować również reakcje alergiczne takie jak nudności, ból głowy, torsje. Objawy te mogą wystąpić u osób szczególnie wrażliwych nawet bez kontaktu bezpośredniego, lecz w wyniku kontaktu z zapachem roślin lub nasion. Ryzyko wystąpienia niepokojących objawów wzrasta przy słonecznej pogodzie, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Niebezpieczne olejki eteryczne zawarte są we włoskach pokrywających liście i łodygę.

W miesiącach czerwiec – wrzesień 2018 roku na terenie Gminy Wiśniowa planowane jest przeprowadzenie trzech zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego na łącznej powierzchni 0,6 hektara..

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Krakowie.



wfośigw

wojewódzki fundusz
ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
w krakowie